

Etoriflex

Etoricoxib INN

Composition

Etoriflex 60 tablet : Each film coated tablet contains □ □
□ Etoricoxib INN 60 mg.
Etoriflex 90 tablet : Each film coated tablet contains
□ Etoricoxib INN 90 mg.

Indication

Acute pain & inflammation, Chronic musculo-skeletal pain, Osteoarthritis, Rheumatoid arthritis, Acute pain associated with dental surgery, Acute gouty arthritis, Primary dysmenorrhoea and Ankylosing spondylitis.

Dosage and Administration

Adult and adolescent (over 16 years):

- ◆ Osteoarthritis, Chronic musculo-skeletal pain,
□ Dysmenorrhoea: 60 mg once daily
- ◆ Rheumatoid arthritis, Ankylosing spondylitis: 90 mg
□ once daily
- ◆ Acute pain associated with dental surgery and Acute
□ gouty arthritis: 120 mg once daily

Safety and effectiveness of etoricoxib in paediatric patients have not been established.

Contraindication

Patients with known hypersensitivity to Etoricoxib or to any of the excipients of this medicinal product. Active peptic ulceration or gastro-intestinal (GI) bleeding, severe hepatic dysfunction.

Children and adolescents under 16 years of age.

Patients with inflammatory bowel disease and severe congestive heart failure.

Precaution

Decreased kidney function and liver function, dehydration, hypertension, history of heart failure, perforation and people over 65 years of age.

Side effect

Common side effects are dizziness, headache, gastrointestinal disorders (e.g. abdominal pain, flatulence, heartburn), diarrhoea, dyspepsia, nausea, asthenia, fatigue, flu-like symptoms. Rare side effects are oedema, weight gain, anxiety, blurred vision, hypertension, epistaxis, dyspnoea, constipation, vomiting, muscle cramps and chest pain.

Drug interaction

Warfarin, ACE inhibitor, Rifampicin, Lithium, Birth control pills, Methotrexate and Digoxin may be affected by Etoricoxib.

Use in pregnancy and lactation

Not recommended.

Packaging

Etoriflex 60 tablet: Each box contains 3x10 tablets in blister pack.

Etoriflex 90 tablet: Each box contains 3x10 tablets in blister pack.

Manufactured by
SOMATEC PHARMACEUTICALS LTD.
DHAKA, BANGLADESH



ইটোরিক্সিব

ইটোরিক্সিব আইএনএন

উপাদান

ইটোরিক্সিব ৬০ ট্যাবলেট : প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে
□ ইটোরিক্সিব আইএনএন ৬০ মি.গ্রা.।
ইটোরিক্সিব ৯০ ট্যাবলেট : প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে
□ ইটোরিক্সিব আইএনএন ৯০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা

তীব্র ব্যথা এবং প্রদাহ, দীর্ঘমেয়াদী মাংসপেশীর ব্যথা, অস্টিওআর্থ্রাইটিস, রিওম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস, দাঁতে অস্ত্রোপচারজনিত তীব্র ব্যথা, তীব্র গেষ্টেবাত, প্রাইমারী ডিসমেনোরিয়া এবং এনকাইলোজিং স্পন্ডাইলাইটিস প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইটোরিক্সিব নির্দেশিত।

সেবনবিধি ও মাত্রা

প্রাপ্ত বয়স্ক এবং কিশোর (১৬ বছরের উপরে):

- ◆ অস্টিওআর্থ্রাইটিস, দীর্ঘমেয়াদী মাংসপেশীর ব্যথা, ডিসমেনোরিয়া:
□ ৬০ মি.গ্রা. করে দৈনিক একবার।
- ◆ রিওম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস, এনকাইলোজিং স্পন্ডাইলাইটিস: ৯০ মি.গ্রা. করে
□ দৈনিক একবার।
- ◆ দাঁতে অস্ত্রোপচারজনিত তীব্র ব্যথা এবং তীব্র গেষ্টেবাত : ১২০ মি.গ্রা. করে
□ দৈনিক একবার।

শিশুদের ক্ষেত্রে কার্যকারিতা ও মাত্রা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

প্রতিনির্দেশনা

ইটোরিক্সিব অথবা এর যে কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলদের ক্ষেত্রে এটি প্রতিনির্দেশিত। সক্রিয় পেপটিক আলসার, পাকস্থলী ও অস্ত্রে রক্তক্ষরণ অথবা তীব্র ভাবে অকার্যকর যকৃতের রোগীদের ক্ষেত্রে ইটোরিক্সিব প্রতিনির্দেশিত।

শিশু এবং কিশোর যাদের বয়স ১৬ বছরের নিচে।

অস্ত্রের প্রদাহ, তীব্র কনজেষ্টিভ হার্ট ফেইলিউর রোগীদের ক্ষেত্রে ইটোরিক্সিব প্রতিনির্দেশিত।

সতর্কতা

বৃক্ক ও যকৃতের কর্মক্ষমতা হ্রাস, পানিশূন্যতা, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, পারফোরেশন এবং যাদের বয়স ৬৫ বছরের উর্ধ্বে তাদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে মাথা ঘুরানো, মাথাব্যথা, পাকস্থলী বা অস্ত্রের সমস্যা (ভলপেটে ব্যথা, পেট ফাপা, বৃক জ্বালা), ডায়রিয়া, হজমে সমস্যা, বমি বমি ভাব, দুর্বলতা, অবসাদ, ঠান্ডা ও সর্দি। কদাচিৎ এডেমা, ওজন প্রাপ্তি, দুশ্চিন্তা, ঝাপসাদৃষ্টি, উচ্চ রক্তচাপ, নাক হতে রক্তপাত, শ্বাসকষ্ট, কোষ্ঠকাঠিন্য, বমি, মাংসপেশীর সংকোচন, বৃক্কে ব্যথা পরিলক্ষিত হতে পারে।

ওষুধ আন্তরক্রিয়া

ওয়ারফারিন, এসিই ইনহিবিটর, রিফামপিসিন, লিথিয়াম, জন্মবিরতিকরণ পিল, মিথোট্রেক্সেট এবং ডিগক্সিন এর সাথে ড্রাগ ইন্টারেকশন রয়েছে।

গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকালে ব্যবহার

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে ইটোরিক্সিব ব্যবহার করা যাবে না।

বাহ্যিক মোড়ক

ইটোরিক্সিব ৬০ ট্যাবলেট : প্রতিটি বাক্সে আছে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট
□ ব্লিস্টার প্যাকে।

ইটোরিক্সিব ৯০ ট্যাবলেট : প্রতিটি বাক্সে আছে ৩ X ১০ টি ট্যাবলেট
□ ব্লিস্টার প্যাকে।



প্রস্তুতকারক
সোমটেক ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ
ঢাকা, বাংলাদেশ